



Najaars- en wintermaatregelen varkens algemeen:

Klimaat:

- Laat minimaal 1 x per jaar uw klimaatspecialist uw bedrijf screenen.
- Zet inlaten/kanalen op tijd weer in de winterstand en minimaliseer de wind-invloeden.
- Controleer de ingestelde streeftemperaturen en minimum/maximum ventilatie in de klimaatcomputer of de regelkast voor de verschillende dier-categorieën (zeugen, biggen en vleesvarkens) → als bijvoorbeeld de minimum ventilatie te laag staat ingesteld, zal de afdeling te vochtig worden.
- Beoordeel regelmatig het gedrag en het uiterlijk van de dieren → ligplaats, liggedrag, haarkleed en onrust blijven één van de belangrijkste meetpunten om te beoordelen of het klimaat in orde is.
- Voorkóm tocht bij de dieren → controleer het isolatiemateriaal en dicht alle lekken en kieren → let hierbij op tochtstrepen op de afdelingswanden/muren.
Probeer dieren gelijk over een afdeling te verdelen zodat koude luchtval (en dus putventilatie) wordt voorkómen
- Voorkóm putventilatie → bijvoorbeeld goed afsluiten van pompgaten na de afvoer van de mest is van essentieel belang.
- Bij twijfel → temperatuur-check “op diernivo” met een thermometer.
- Zorg ervoor dat voelers op de juiste plaats hangen en zijn geijkt.
- Controleer de ventilatie-systemen → reinigen van meetwaaiers (+ controle op soepel rondlopen → betere regeling min. vent.), afstelling diafragmaschuiven, etc.
- Controleer de verwarmingssystemen. Vergeet de vloerverwarming niet → het temperatuursverschil tussen aanvoer en retour bij een afdeling mag maximaal 5 gr. C. zijn.
- Controleer de alarm-installatie.

Voeding / management:

- Check de ingestelde voercurves zeugen/biggen/vleesvarkens in brij- of droogvoersystemen en pas de voergift aan indien stal- of dieromstandigheden hierom vragen (bijv. stal-temperatuur of dierconditie).
- Controleer (regelmatig) het soortelijk gewicht van het voer → bij verandering van het soortelijk gewicht dient u bijv. de stand van de voerdosator aan te passen.
- Verhoog **indien mogelijk** bij echt koude dagen het droge stofgehalte van de brij → hiermee beperkt u de hoeveelheid koude massa die een dier moet opnemen!
- Controleer de watergift en wateropname → bijv. onnodig hoge wateropname in de dracht (≥ 12 liter/zeug/dag) gaat ten koste van voer voor conditie-behoud en conditie-herstel.
Door watervermorsing bij de vleesvarkens moet meer mest worden afgevoerd.
- Controleer de verlichting en maak deze schoon. Check tijds klokken en stel zonodig tijdsintervallen opnieuw in → voldoende licht is o.a. belangrijk voor een goede dier-controle.
Voldoende licht bij de kop van een zeug/gelt is van groot belang in de dekstal!
- Voorzie bij koud weer het strobed van extra stro in geval van groepshuisvesting dragende zeugen / gelten.
- Creëer een dichte ligplaats (rubber mat) voor de lichte biggen in geval van een volledig rooster in de biggenopfok.